


BULETIN DE AVERTIZARE**Nr 12 din 21.04.2026**

Având în vedere evoluția condițiilor climatice din aceasta primăvara Autoritatea Națională Fitosanitară va informa cu privire la posibilitatea apariției și dezvoltării dăunătorului **GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR DE PORUMB** (*Tanymecus dilaticollis*). Aceasta atacă în stadiul de adult , începând cu faza de răsărire a plantelor de porumb și floarea-soarelui.



Descriere: Culoarea corpului este brun-cenușie, mai deschisă ventral și are lungimea cuprinsă între 6,5 și 8 mm. Talia femelelor este mai mare decât cea a masculilor. Adultul are formă oval-alungit și prezintă un cioc, evident numit rostru. Larva este apodă, iar la maturitate ajunge la 8-9 mm, de culoare alb-strălucitor și prezintă o pubescență gălbuie. Pupa este de culoare albă, de 5-9 mm lungime.

Mod de atac: adultul retează plantele tinere de la colet , iar într-o fază mai înaintată insectele rod marginal frunzele , sub formă de trepte , pagube mari înregistrându-se la culturile însămânțate mai târziu . **ATACUL ESTE MAI PUTERNIC ÎN PRIMĂVERILE SECETOASE** . Daune mari se produc în perioada răsăririi culturilor , iar *adultii de Tanymecus migrează de la cultura de porumb la cea de floarea soarelui*.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de dăunare : 3 exemplare/mp ; fenofaza culturii : răsărire 3-4 frunze .

Folosiți unul din produsele de mai jos, **ca tratament de corecție în vegetație** , după caz :

- MOSPILAN 20 SP 0,100 kg/ ha
- KARATE ZEON 0,15 l/ha
- DELTAGRI..... 0,3 l/ha

Se vor utiliza **numai produse de protecție a plantelor omologate de C.N.O.P.P.P., pentru utilizare în România, care se regăsesc în baza de date PEST - EXPERT:** <https://aloe.anfd.ro/>.

Important :

Producătorii agricoli (utilizatorii de produse de protecție a plantelor) **trebuie să cunoască și să respecte întocmai** condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatarea agricolă așa cum sunt prevăzute în **“Ghidul de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor”** <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>.

Alte recomandări:

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștita sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vântului mai mari de 3 m/sec. **NU SE VOR EFECTUA TRATAMENTE FITOSANITARE !!!**
- citiți cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizați responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratați lângă cursurile de apă ,șanțuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare , bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apa de clătire în cuva;
- aplicați pe parcele tratate restul de soluție din cuva , diluata cu apa de clătire;
- spălați aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversați apele reziduale lângă cursurile de apă , locuințe.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa **Oficiului Fitosanitar Botoșani** la tel/fax: **0231/518227** e-mail: ofbotosani@anfof.ro

Vă rugăm să afișați la loc vizibil Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesați.

**Responsabil prognoză și avertizare
Ing. NECHIFOR Radu**

